

# ARGOT PIPE

Pour briller  
en société!

Connais-tu le petit  
argot illustré de  
la pipe ?



## Pipe écolo

Se faire brouter la tige,  
sucrer le poireau, la banane,  
l'asperge...

## Pipe gourmande

Faire une gâterie, sans  
oublier de goûter les noix,  
les bonbons, les olives...

## Mais aussi...

Turtuler, tailler une plume, pomper, faire un pompier,  
tout en s'amusant avec les bijoux de famille, les valseuses,  
les joyeuses...

Et tu peux mettre le cache-nez à l'enrhumé, une  
moumoutte au petit chauve... Une capote quoi!

\* nom d'une épée courte et large

## Pipe musicale

Jouer du trombone, du  
pipeau, de la flûte à un  
trou...

## Pipe guerrière

Sucrer le dard, le  
braquemard\* tout en  
s'emparant de l'Alsace et  
de la Lorraine...

## SUCE ET ASTUCES

### Prince-Albert et autres bling-bling

Certains font percer leur bite pour le look et/ou les sensations procurées par les piercings.

Prince-Albert (l'anneau passe dans l'urètre et ressort sous le gland), Ampallang (le piercing traverse le gland à l'horizontale), Foreskin (piercing du prépuce)... chacun son style.

- Le premier mois après la pose, évite tout contact piercing / Q / bouche pour écarter les risques de mauvaise cicatrisation et de transmission d'infections.
- Pour l'hygiène et une bonne cicatrisation, qui peut durer plusieurs semaines ou mois, nettoie chaque jour la partie percée (savon doux au PH neutre + un antiseptique au moins les trois premières semaines).
- Porte de préférence des sous-vêtements amples et en coton.
- Attention aux appareils dentaires quand tu te fais sucer !

### Le petit + historique

selon la légende, le Prince Albert, mari de la reine Victoria, aurait donné son nom au fameux piercing. Il aurait été percé au gland pour que son sexe soit maintenu vers le bas, attaché à la cuisse par un crochet cousu dans ses pantalons (extrêmement moulants à l'époque...).

# TU SUCES ?



# #5

# CHLAMYDIAE

## De quoi parle-t-on ?

D'une bactérie, Chlamydia Trachomatis, qui provoque une infection (chlamydie).

## Est-elle fréquente ?

Oui elle est très répandue, c'est même la number one du Box Office des IST<sup>1</sup> !

## Comment ça se transmet ?

Lors d'une fellation ou d'un rapport anal non protégés, mais aussi par simple contact avec une muqueuse infectée. Les chlamydiae peuvent se répandre sur l'ensemble du corps, par exemple du sexe à l'œil par la main, provoquant alors une conjonctivite.

## Quels sont les signes ?

Cette infection est le plus souvent asymptomatique. Si signes il y a, ils apparaissent entre quelques jours et quelques semaines après la contamination : brûlures en urinant, maux de ventre, parfois écoulements de pus au bout du gland. Les chlamydiae peuvent aussi infecter l'anus - cela se manifeste par le LGV

(Lymphogranulome Vénérien)- ou la gorge.

Si l'infection n'est pas traitée, elle peut dégénérer et atteindre les testicules et la prostate.

## Ça se soigne ?

Oui, grâce à un traitement antibiotique très efficace.

## Où et quand consulter ?

Régulièrement, surtout si tu as de nombreux partenaires, dans le cadre d'un check-up sexuel, car tu peux être infecté sans le savoir. Le dépistage des chlamydiae se fait à partir d'une analyse de ton urine. On peut aussi faire un prélèvement au niveau de l'anus ou de la gorge selon le lieu où se trouve l'infection. Tu peux consulter ton médecin, te rendre dans un centre de santé spécialisé, dans un centre de dépistage ou au Checkpoint\*\*.

## Fellation et chlamydiae : comment prévenir ?

Durant ton traitement, évite les pipes. Si la capote reste ce qu'il y a de mieux contre le risque de transmission des chlamydiae, elle ne protège pas toute la zone contaminante. Prévenir tes partenaires leur permettra d'être également traités et t'évitera une nouvelle contamination.

# BONNES PRATIQUES DE LA FELLATION

Autant que possible, utilise un préservatif.

Si tu n'utilises pas de préservatif :

**Toi suceur :** Avant et après la pipe, évite tout ce qui peut aggraver tes muqueuses buccales (brossage de dents, curage interdentaire, bains de bouche alcoolisés, etc.). Pense à la transmission indirecte lors de pratiques collectives : en suçant un partenaire qui a une IST<sup>1</sup> tu peux contaminer un autre partenaire sucé dans la foulée. Enfin, évite d'avoir du sperme<sup>2</sup> en bouche pour limiter le risque de contamination par le VIH.

**Toi sucé :** évite d'éjaculer dans la bouche de ton partenaire si tu n'es pas certain de ton statut vis-à-vis du VIH. Veille à l'hygiène de ta queue en la chouchoutant - sans excès - avec des produits lavants doux, non irritants.

1. Infection sexuellement transmissible

2. Le VIH est également présent dans le liquide pré-séminal

# VIH ET AUTRES IST

- Les IST non soignées peuvent augmenter le risque de contracter le VIH lors de rapports non protégés.
- Si tu es séropositif, sois particulièrement vigilant car tu peux être plus sensible aux IST.
- D'une façon générale, il est conseillé à tous de s'inspecter régulièrement bite, couilles, cul et gorge, et de se rendre chez le médecin pour des check-ups réguliers. Une visite annuelle chez le proctologue est conseillée. Il faut pouvoir parler franchement avec son médecin de sa santé sexuelle. Si c'est difficile, renseigne-toi auprès du Kiosque ou de Sida Info Service pour obtenir des contacts.



Le Kiosque Infos Sida  
[www.lekiosque.org](http://www.lekiosque.org)

Réalisé  
avec le soutien  
financier de  
l'INPES

\*\* Checkpoint  
Dispositif de dépistage  
rapide du Kiosque  
01 44 78 00 00

Sida Info Service  
0 800 840 800